WWW.ALEVELAPI.COM

නව

සංශෝධනයන්ද යටත්ය.

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

ජාතික ඇගයීම් හා පරීක්ෂණ සේවාව

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය - 2013

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

www.alevelapi.com

10-සංයුක්ත ගණිතය II

මෙය උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා සකස් කෙරිනි.
මෙය පන්ති කාමර ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය සඳහා ආධාරකයක් ලෙස යොදා ගත හැකිය යනු අපගේ විශ්වාසයයි.

Alevel ඇලෙවල් උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

1. අංශුවක් O ලක්ෂ්‍යයක සිට තිරසට $\frac{\pi}{3}$ කෝණයකින් ආනතියෙන් ප්‍රාරම්භ වේගයෙන් ගුරුත්වය යටතේ ප්‍රක්ෂේපණය කරනු ලැබේ. අංශුව k දූරක් තිරස් ව ගමන් කළවිට O හි මට්ටමට ඉහළින් එහි තිරස් දුර h යැයි ගනිමු.

$\sqrt{3}k = h + \frac{2gk^2}{u^2}$ බව පෙන්වන්න.



O සිට A දක්වා $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ යොදිමෙන්,

→ $k = \frac{u}{2}T$ .....(1) (5)

↑ $h = \frac{\sqrt{3}u}{2}T - \frac{1}{2}gT^2$ .....(2) (10)

(1) න් හා (2) න්, $h = \sqrt{3}k - \frac{1}{2}g\left(\frac{2k}{u}\right)^2$ (5) (T ඉවත් කිරීමට)

$\Rightarrow \sqrt{3}k = h + \frac{1}{2}g\frac{4k^2}{u^2}$

$\Rightarrow \sqrt{3}k = h + \frac{2gk^2}{u^2}$ (5) ← පැහැදිලිව

25

www.alevelapi.com

A/L උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

2. පළල b වූ වැස්ස රථයක් ඒකාකාර u ප්‍රවේගයෙන් සෘජු පාරක් දිගේ පදික වේදිකාවට සමාන්තරව නැඟෙනහිර දිශාවට ගමන් කරයි. සිරිමි ළමයෙක් වැස්ස රථයට d දුරක් ඉදිරියෙන් පදික වේදිකාවේ සිට පාරට බැස්ස. වැස්ස රථයේ වලිනා දිශාව සමඟ α සුළු කෝණයක් සාදන දිශාවට $v\ (< u \sec\alpha)$ ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ගැවිල් ළමයා, වැස්ස රථයෙහි නොහැපී, යන්තමින් බේරෙයි නම්, $bu = (b\cos\alpha + d\sin\alpha)v$ බව පෙන්වන්න.



$\text{vel}(B,E) =$ 

$\text{vel}(V,E) =$

$\text{vel}(B,V) =$

$$\text{vel}(B,V) = \text{vel}(B,E) + \text{vel}(E,V)$$



$$\tan\theta = \frac{v\sin\alpha}{u - v\cos\alpha}$$

$$\Rightarrow \frac{b}{d} = \frac{v\sin\alpha}{u - v\cos\alpha}$$

$$\Rightarrow \quad bu = (b\cos\alpha + d\sin\alpha)v.$$

25

උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

3. ස්කන්ධය m වූ අංශුවක්, සුමට තිරස් මේසයක් මත තිශ්චල ව ඇත. එහි එතෙන ස්කන්ධය $2m$ වූ අංශු දෙකක් මේසය මත ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවලට u හා $2u$ වේගවලින්, නිසල ව තිබෙන අංශුව දෙසට එළඹෙන ලෙසින් එය සහිත එකවිට ගැටී හා වේ. ගැටුම්වලට පසු සංයුක්ත අංශුවේ වේගය සොයා, ගැටුම් නිසා ඉවත්වන චාලක ශක්ති හානිය $\frac{23}{5}mu^2$ බව පෙන්වන්න.





පද්ධතියට $\underline{I} = \Delta(m\underline{v})$ යෙදීමෙන්,

$\longrightarrow \quad 0 = 5mv - (2m \times 2u - 2mu)$

$v = \frac{2u}{5}$

10 හෝ 0 ගැ. සැ. නි වැරදි

5

$\Delta T = \frac{1}{2}(5m)v^2 - \frac{1}{2}(2m)(2u)^2 - \frac{1}{2}(2m)u^2$ 5

$= \frac{1}{2}(5m)\left(\frac{2u}{5}\right)^2 - 4mu^2 - mu^2$

$= \frac{2mu^2}{5} - 5mu^2 = -\frac{23}{5}mu^2$ 5

∴ චාලක ශක්ති හානිය $= \frac{23}{5}mu^2$

25

---

(2)



ලිමය, C සහ B වෙත යාමට කැප්පුණු කාලය = රළුය A සහ B වෙත යාමට කැප්පුණු කාලය

ලිමය $\longrightarrow S = ut$

$b = V\sin\alpha \cdot t \quad -(1)$

රළුය $\longrightarrow S = ut$

$d + \frac{b}{\tan\alpha} = uT$

$\tan\alpha = \frac{b}{d'}$

$d' = \frac{b}{\tan\alpha}$

$\frac{1}{u}\left[d + \frac{b\cos\alpha}{\sin\alpha}\right] = T \quad -(2)$

(1) (2) ට

$\frac{b}{V\sin\alpha} = \frac{1}{u}\left[\frac{d\sin\alpha + b\cos\alpha}{\sin\alpha}\right]$

$bu = V\left[b\cos\alpha + d\sin\alpha\right]$

Alevel ලාපිස උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

4. ස්කන්ධය m වූ අංශුවක් තිරසට ආනතිය α වූ අචල සුමට තලයක් මත නිසලව ඇති අතර එය, තලයේ ඉහළ ම කෙළවරෙහි වූ කුඩා සුමට කප්පියක් මතින් යන සැහැල්ලු අවිතන්‍ය තන්තුවක් මගින්, නිදහසේ එල්ලෙන M $(M > m\sin\alpha)$ ස්කන්ධයකට සම්බන්ධ කර ඇත. රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි, M ස්කන්ධය කප්පිය ආයන්තයේ තබා ආනත තලයේ උපරිම බැවුම් රේඛාවක් දිගේ පහත්තුව තදව, පද්ධතිය නිශ්චලතාවයේ සිට මුදා හරිනු ලැබේ. ස්කන්ධය m වූ අංශුව තලය දිගේ ඉහළට d දුරක් චලනය වූ විට එහි වේගය v යන්න $(M+m)v^2 = 2gd(M - m\sin\alpha)$ මගින් දෙනු ලබන බව පෙන්වන්න.





5

$\underline{F} = m\underline{a}$ යෙදීමෙන්,

m ↗ $T - mg\sin\alpha = mf$ 5

M ↓ $Mg - T = Mf$ 5

$\therefore f = \dfrac{(M - m\sin\alpha)g}{(M+m)}$ 5

m ↗ $v^2 = u^2 + 2as$ යෙදීමෙන් $v^2 = 2(f)(d) = 2\dfrac{(M - m\sin\alpha)g}{(M+m)}d$

$\Rightarrow (M+m)v^2 = 2gd(M - m\sin\alpha)$ 5

25

විකල්ප විසඳුම

ඉහත රූප සටහනට 5

ශක්ති සංස්ථිති නියමයෙන්" $\dfrac{1}{2}Mv^2 + \dfrac{1}{2}mv^2 = Mgd - mgd\sin\alpha$ 15

$= (M - m\sin\alpha)gd$

$\Rightarrow (M+m)v^2 = 2gd(M - m\sin\alpha)$ 5

25

Alevel Lapis උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාල සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

5. පුප්පරුදු අංකනයෙන්, O අචල ලක්ෂයකට අනුබද්ධයෙන් A හා B ලක්ෂ දෙකක පිහිටුම් දෛශික පිළිවෙලින් $\underline{i}$ හා $\underline{i}+\underline{j}$ යැයි ගනිමු. C යනු, A හරහා OB ට සමාන්තර සරල රේඛාව මත වූ ලක්ෂ්‍යයක් යැයි ද ගනිමු.
$\overrightarrow{OC} = (1+\lambda)\underline{i} + \lambda\underline{j}$ බව පෙන්වන්න; මෙහි λ යනු තාත්ත්වික සංඛ්‍යාවක් වේ.
OB ට BC ලම්බ වන පරිදි වූ λ හි අගය සොයන්න.



$\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AC}$ සහ $\overrightarrow{AC} = \lambda(\underline{i}+\underline{j})$, මෙහි $\lambda \in \Re$. (5)

$\therefore \overrightarrow{OC} = \underline{i} + \lambda(\underline{i}+\underline{j})$
$= (1+\lambda)\underline{i} + \lambda\underline{j}$ (5)

$BC \perp OB \Rightarrow \overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{OB} = 0$ .....(i) (5)

$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OC}$
$= -\underline{i} - \underline{j} + (1+\lambda)\underline{i} + \lambda\underline{j}$.
$= \lambda\underline{i} + (\lambda-1)\underline{j}$ (5)

(1) න්

$$\left[\lambda\underline{i} + (\lambda-1)\underline{j}\right]\cdot(\underline{i}+\underline{j}) = 0.$$

$$\Rightarrow \quad \lambda + (\lambda-1) = 0$$

$$\Rightarrow \quad \lambda = \frac{1}{2}.$$ (5)

25

උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

6. රළු තිරස් මේසයක් මත නිසල ව ඇති බර w_1 වූ ලී කුට්ටියක්, පැහැල්ලු අවිතතය BC තන්තුවකින් සිරස් බිත්තියක් මත පිහිටි කුඩා අචල ඇණයකට රූපයෙහි දක්වා ඇති පරිදි සම්බන්ධ කර ඇත. තන්තුවේ A ලක්ෂ්‍යයක දී බර w_2 වූ අංශුවක් ගැටගසා ඇත්තේ CA යටි අත් සිරස සමඟ α කෝණයක් සාදන පරිදි ය. AB කොටස තිරස් නම් සහ කුට්ටිය සීමාකාරී සමතුලිතතාවයේ ඇත්නම්, $\mu w_1 = w_2 \tan\alpha$ බව පෙන්වන්න; මෙහි μ යනු කුට්ටිය හා මේසය අතර ස්පර්ශණ සංගුණකය වේ.





W_1 ↑ $R = w_1$ (5)

$F = \mu R = \mu w_1$ (5)

පද්ධතියට → $T_1 \sin\alpha = F$

W_2 ↑ $T_1 \cos\alpha = w_2$ (5)

$\Rightarrow \quad \tan\alpha = \dfrac{F}{w_2}$

$\Rightarrow \quad w_2 \tan\alpha = \mu w_1$ (5)

25

උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

7. A, B හා C යනු Ω නියැදි අවකාශයක අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිෂ්කාර හා නිරවශේෂ සිද්ධි කුලකයක් යැයි ගනිමු. $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$, $P(B \cup C) = \frac{1}{2}$ හා $P(C \cup A) = \frac{2}{3}$ යන සම්භාවිතාවන් එකවිට තිබිය හැකි ද? ඔබේ පිළිතුර සනාථ කරන්න.

නොහැකිය. (5)

A හා B අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිෂ්කාර නිසා,

$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

$\Rightarrow P(A) + P(B) = \frac{1}{2}$ .....(1)

එලෙසම, $P(B) + P(C) = \frac{1}{2}$ .....(2) (5)

හා $P(C) + P(A) = \frac{2}{3}$ .....(3)

3 බව

$(1) + (2) + (3) \Rightarrow$

$2[P(A) + P(B) + P(C)] = \frac{5}{3}$

$\therefore P(A) + P(B) + P(C) = \frac{5}{6}$ .....(4) (5)

A, B හා C නිරවශේෂ සිද්ධි බැවින්

$A \cup B \cup C = \Omega$.

$\therefore P(A) + P(B) + P(C) = P(\Omega) = 1$ .....(5) (5)

(4) හා (5) සමාන නොවන බැවින් ඉහත සම්භාවිතාවයන් සපුරාලන පරිදි A, B හා C සිද්ධි පැවතිය නොහැක. (5)

25

www.alevelapi.com

Aeve Api උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

8. A හා B යනු Ω නියැදි අවකාශයක සිද්ධි දෙකක් යැයි ගනිමු. $P(A|B) = P(A|B')$ නම්, A හා B ස්වායත්ත වන බව පෙන්වන්න; මෙහි B' මගින් B හි අනුපූරක සිද්ධිය දක්වේ.

$P(A|B) = P(A|B')$ නම්,

$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B')}{P(B')}$, $[P(B) \neq 0, P(B') \neq 0.]$ (5)

$= \frac{P(A) - P(A \cap B)}{1 - P(B)}$, $[P(B) \neq 0, 1$ එනම් $0 < P(B) < 1.]$ (5)

$\Rightarrow \quad P(A \cap B) - P(B)P(A \cap B) = P(A)P(B) - P(B)P(A \cap B)$ (5)

$\Rightarrow \quad P(A \cap B) = P(A)P(B)$ (5)

$\therefore A$ හා B ස්වායත්ත වේ. (5)

25

---

9. පහත දක්වෙන නිරීක්ෂණ අටෙහි මධ්‍යන්‍යය හා මාතය පිළිවෙළින් 4 හා 6 වේ:

2, 3, 6, 2, 1, x, y, z

මෙහි x, y හා z නිඛිල සංඛ්‍යා වේ. x, y හා z හි අගයන් සොයා, නිරීක්ෂණ අෂ්ටයේ සම්මත අපගමනය ගණනය කරන්න.

මධ්‍යන්‍යය 4 බැවින්,

$2+3+6+2+1+x+y+z = 4 \times 8$ (5)

$\therefore x + y + z = 32 - 14 = 18$ .....(1)

මාතය 6 බැවින් අඥාත 3න් 2ක් වත් 6 විය යුතුය. (5)

(1) ට අනුව අනෙක් අඥාතයද 6 විය යුතුය.

$\therefore x = y = z = 6$ (5)

සම්මත අපගමනය $= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n}} = \sqrt{\frac{4+1+4+4+9+3\times 4}{8}}$ (5)

$= \sqrt{\frac{34}{8}} = \frac{\sqrt{17}}{2}$ (5)

25

Alevel ඇසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

10. සංඛ්‍යාත වගුවකට පළලින් සමාන පන්ති ප්‍රාන්තර පහක් ඇත. තෙවන පන්ති ප්‍රාන්තරයේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය 22.5 වේ. පස්වන පන්ති ප්‍රාන්තරයේ උඩත් පන්ති මායිම 40 වේ. පළමු පන්ති ප්‍රාන්තරයේ සිට අනුයිදිගටලිත් පන්ති ප්‍රාන්තරවල සංඛ්‍යාතයන් 7, 19, 27, 15 හා 2 වේ. ව්‍යාප්තියේ මාතය ගණනය කරන්න.

පන්ති ප්‍රාන්තරයක තරම (පළල) $= 2x$ යයි ගනිමු.



$\therefore 5x = 40 - 22.5$ (5)

$x = 3.5$ (5)

මාතය ඇතුළත් වන්නේ 3 වන පන්ති ප්‍රාන්තරය වන :19-26- ටය. (5)

$\therefore$ මාතය $= 19 + \left(\frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2}\right) C$, මෙහි $\Delta_1 = 27 - 19 = 8, \Delta_2 = 27 - 15 = 12, C = 7.$ (5)

මාතය හඳුනා ගැනීමට මූල පිරි දිය යුතුය

$= 19 + \frac{8}{20} \times 7$

$= 21.8$ (5)

25

www.alevelapi.com

උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාල සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

11. (a) අංශුවක්, අචල දෘඪ සිරස් මෙවිමක එම ලක්ෂ්‍යයෙන් සිරස්ව උඩු අතට u ප්‍රවේගයෙන් ප්‍රක්ෂේප කරනු ලැබේ. ගුරුත්වය යටතේ චලනය වීමෙන් පසු එය මෙවිම හා ගැටෙයි. අංශුව හා මෙවිම අතර ප්‍රත්‍යාගති සංගුණකය $e (0 < e < 1)$ වේ.

(i) තුන්වෙනි ගැටුම දක්වා අංශුවේ චලිතය සඳහා ප්‍රවේග-කාල ප්‍රස්තාරයකි දළ සටහනක් අඳින්න.

(ii) තුන්වෙනි ගැටුම දක්වා අංශුව ඔත්තා කාලය $\frac{2u}{g}(1+e+e^2)$ බව පෙන්වන්න.

(iii) නිස්චලතාවයට පැමිණීමට අංශුව ගන්නා මුළු කාලය $\frac{2u}{g(1-e)}$ බව තවදුරටත් පෙන්වන්න.

(b) මුළු ස්කන්ධය මෙට්‍රික් ටොන් 300 ක් වූ දුම්රියක්, එන්ජිම ක්‍රියා විරහිත කර, සිරස්ව $\sin^{-1}\left(\frac{1}{98}\right)$ ආනතියක් ඇති සෘජු දුම්රිය මාර්ගයක් දිගේ පහළට නියත වේගයෙන් චලනය වේ. දුම්රියේ ඉහළට චලිතය කෙරෙහි කර්ෂණ-ප්‍රතිරෝධයේ විශාලත්වය, පහළට චලිතයේ දී වූ නියත අගයේම පවතියි නම්, දුම්රිය නියත $54\ \text{km h}^{-1}$ වේගයකින් එම දුම්රිය මාර්ගයේ ම ඉහළට ඇදගෙන යාම සඳහා එන්ජිම මගින් $900\ \text{kW}$ බල පෙන්වන්න.

දුම්රිය පෘෂ්ඨ තීරස් මාර්ගයක, කලින් සිදුවුණු විශාලත්වයම් ඇති ප්‍රතිරෝධයක් පහිත ව $18\ \text{km h}^{-1}$ ක වේගයකින් ගමන් කරන විට එන්ජිම මෙම රථය සහිත ව ක්‍රියා කරන බව උපකල්පනය කරමින් දුම්රියෙහි ත්වරණය සොයන්න.

[ගුරුත්වජ ත්වරණය $g = 9.8\ \text{m s}^{-2}$ ලෙස ගන්න.]

(a)



(ii) පළමු ගැටුම සඳහා ගතවන කාලය T_1 යැයි ගනිමු.

$T_1/2 = u/g \quad \Rightarrow \quad T_1 = 2u/g$ (5)

උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

පළමු ගැටුමේ සිට දෙවන ගැටුම දක්වා කාලය

$T_2 = 2eu/g$ (5)

දෙවන ගැටුමේ සිට තුන්වන ගැටුම දක්වා කාලය

$T_3 = 2e^2u/g$ (5)

තුන්වන ගැටුම දක්වා ගතවන මුළු කාලය $= T_1 + T_2 + T_3 = \frac{2u}{g}(1+e+e^2)$ (5)

(iii) අංශුවට නිශ්චලතාවයට පත්වීම සඳහා ගතවන කාලය

$= T_1 + T_2 + T_3 + \ldots$ (5)

$= \frac{2u}{g}(1+e+e^2+e^3+\ldots)$ (5)

$= \frac{2u}{g}\sum_{r=0}^{\infty} e^r$ (5)

$= \frac{2u}{g}\frac{1}{(1-e)}$ (5)

$= \frac{2u}{g(1-e)}$

70

---

b) දුම්රියේ ස්කන්ධය M =300,000 kg

(5)



$\sin\alpha = \frac{1}{98}$

දුම්රිය ආනත තලය ඔස්සේ නියත ප්‍රවේගයෙන් පහලට චලනය වේ.

$F = ma$ යෙදීමෙන්

$Mg\sin\alpha - R = 0$ (10)

$300{,}000 \times 9.8 \times \frac{1}{98} - R = 0$

$R = 30{,}000$ N (5)

Alevel Lapi උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාල සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

උඩු අත් වලිතය සඳහා



$V = 54\ \text{kmh}^{-1} = \frac{54\times1000}{60\times60}$

$V = 15\ \text{ms}^{-1}$ (5)

ප්‍රකර්ෂණ බලය K යැයි ගනිමු. $\underline{F} = m\underline{a}$

$K - R - Mg\sin\alpha = 0$ (10)

$P = FV$ යෙදීමෙන්

ජවය, $P = (R + Mg\sin\propto)V$

$= (30{,}000 + 30{,}000)\times 15 = 900{,}000$

$= 900\ \text{KW}$ (5)

40

ප්‍රවේගය $V = 18\ \text{kmh}^{-1} = \frac{18{,}000}{60\times60}\ \text{ms}^{-1}$

$= 5\ \text{ms}^{-1}$ (5)

ප්‍රකර්ෂණ බලය $= \frac{P}{V}$

$= \frac{900{,}000}{5}\ \text{N}$ (10)

$= 180{,}000$ (5)

$\underline{F} = m\underline{a}$

$180{,}00 - 30{,}000 = 300{,}000 \times a$; මෙහි a යනු ත්වරණය වේ (10)

ත්වරණය $= \frac{150{,}000}{300{,}000}$ (5)

$a = \frac{1}{2}\ \text{ms}^{-2}$ (5)

40

උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාල සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

12. (a) ABC ත්‍රිකෝණය, ස්කන්ධය M වූ ඒකාකාර සුමට කුඤ්ඤයක ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය ඔස්සේ වූ සිරස් හරස්කඩකි. AC හා BC රේඛා අඳුළ මුහුණතවල වැඩිතම බෑවුම් රේඛා වන අතර BA හා AC රේඛා BC සමඟ සමාන α $\left(0<\alpha<\frac{\pi}{4}\right)$ කෝණ සාදයි. තිරසට α කෝණයක ආනතියකින් යුතු අචල සුමට තලයක් මත BC අන්තර්ගත මුහුණත ඇතිව ද, AB තිරස්ව ද කුඤ්ඤය රූපයේ දැක්වෙන පරිදි තබා ඇත. ස්කන්ධ පිළිවෙළින් m_1 හා m_2 වන P හා Q අංශු දෙකක්, පිළිවෙළින් AB හා AC මත තබා, A ශීර්ෂයෙහි වූ කුඩා සුමට කප්පියක් උඩින් යන සැහැල්ලු අවිනත්‍ය තන්තුවකින් සම්බන්ධ කර ඇත. තන්තුව තදව, පද්ධතිය නිශ්චලතාවයෙහි සිට මුදා හරිනු ලැබේ.



එක් එක් අංශුවේ කුඤ්ඤයට සාපේක්ෂව ත්වරණයක්, කුඤ්ඤයේ ත්වරණයක් නිර්ණය කිරීම සඳහා P අංශුවට BA දිගේ ද, Q අංශුවට AC දිගේ ද, මුළු පද්ධතියට BC දිගේ ද වලිත සමීකරණ ලියා දක්වන්න.

$m_1 = m_2$ නම්, කුඤ්ඤයට සාපේක්ෂව එක් එක් අංශුවේ ත්වරණය ශූන්‍ය වන බව ද කුඤ්ඤයේ ත්වරණයේ විශාලත්වය $g\sin\alpha$ බව ද පෙන්වන්න.

(b) ස්කන්ධය m වූ P අංශුවක්, අරය a හා කේන්ද්‍රය O වූ අචල ගෝලයක සුමට ඔතිර පෘෂ්ඨයේ ඉහළ ම ලක්ෂ්‍යයෙහි තබා ඇත. ස්කන්ධය $2m$ වූ වෙනත් Q අංශුවක් තිරස්ව u ප්‍රවේගයෙන් වලනය වෙමින් P සමඟ සරල ලෙස ගැටෙයි. P හා Q අතර ප්‍රත්‍යාගති සංගුණකය $\frac{1}{2}$ වේ. ගැටුමෙන් මොහොතකට පසු P අංශුවේ ප්‍රවේගය සොයන්න.

OP අරය θ කෝණයකින් හැරී ඇති විට තවමත් P අංශුව ගෝලය සමඟ ස්පර්ශව ඇතැයි උපකල්පනය කරමින්, P අංශුව මත ගෝලය මගින් ඇති කරන ප්‍රතික්‍රියාවේ විශාලත්වය $\frac{m}{a}\left[ga(3\cos\theta-2)-u^2\right]$ බව පෙන්වන්න.

$u=\sqrt{ga}$ නම්, Q සමඟ ගැටුමෙන් මොහොතකට පසු P අංශුව ගෝලීය පෘෂ්ඨය හැර යන බව ද පෙන්වන්න.

www.alevelapi.com
Alevel Apis උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

(a)



බල සඳහා – (10)

$\text{acc}(W, E) =$

$\text{acc}(P, W) =$

$\text{acc}(Q, W) =$



10 10

$\text{acc}(P, E) =$

$\text{acc}(Q, E) =$



$\underline{F} = m\underline{a}$ යෙදීමෙන්;

P සඳහා ← $T = m_1(f + F\cos\alpha)$ ---------- (1) (10)

Q සඳහා 2α $m_2g\sin 2\alpha - T = m_2(f + F\cos\alpha)$ ---------- (2) (10)

පද්ධතිය සඳහා α

$(M + m_1 + m_2)g\sin\alpha = MF + m_1(f + F\cos\alpha) + m_2(f + F\cos\alpha)$ ---- (3) (10)

$(M + m_1 + m_2)g\sin\alpha = MF + m_1(f\cos\alpha + F) + m_2(f\cos\alpha + F)$

50

උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

$m_1 = m_2$

$(1) + (2) \Rightarrow m_1 g\sin 2\alpha = m_1 2(f + F\cos\alpha)$

$f + F\cos\alpha = g\sin\alpha\cos\alpha$ ---------- (4) 5

$(3) \Rightarrow (M + 2m_1)g\sin\alpha = MF + 2m_1(F + f\cos\alpha)$

$= (M + 2m_1)F + 2m_1 f\cos\alpha$ 5

$g\sin\alpha = F + \frac{2m_1}{M+2m_1} f\cos\alpha$ ---------- (5) 5

$(4) + (5)\cos\alpha \Rightarrow f = \frac{2m_1}{M+2m_1} f\cos^2\alpha$ 5

$Mf + 2m_1\sin^2\alpha f = 0 \Rightarrow f = 0$ 5

දැන් (5), $\Rightarrow F = g\sin\alpha$

25

---

www.alevelapi.com

උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාල සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

(b)





$\underline{I} = \Delta(m\underline{v})$ ⟶ අංශු සඳහා:

$0 = 2mv_2 + mv_1 - 2mu$ (10)

$2v_2 + v_1 = 2u$ ..... (1)

නිව්ටන්ගේ ප්‍රත්‍යාගති නියමය:

$v_1 - v_2 = \frac{1}{2}u$ (10)

$2v_1' - 2v_2 = u$ ..... (2)

(1) + (2) $\Rightarrow v_1 = u$ (5)

25

www.alevelapi.com

උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.



5

රූප සටහන

ශක්ති සංස්ථිති නියමය යෙදීමෙන්

$$\frac{1}{2}mv^2 + mga\cos\theta = \frac{1}{2}mu^2 + mga$$

10 + 5 = 15

$$v^2 = u^2 + 2ga(1-\cos\theta)$$

5

θ $F = ma$ යෙදීමෙන් :

$$R - mg\cos\theta = -\frac{mv^2}{a}$$

10

$$R = mg\cos\theta - \frac{m}{a}\left[u^2 + 2ga(1-\cos\theta)\right]$$

5

$$= \frac{m}{a}\left[ga\cos\theta - u^2 - 2ga(1-\cos\theta)\right]$$

$$= \frac{m}{a}\left[3ga\cos\theta - 2ga - u^2\right]$$

10 10 5

$$\frac{m}{a}\left[ga(3\cos\theta - 2) - u^2\right]$$

$$\frac{m}{a}\left[9a\ (3\cos\theta - 2)\right]$$

$u = \sqrt{ga}$ and $\theta = 0 \Rightarrow R = 0$.

5

5

∴ ගැටුමෙන් මොහොතකට පසු P අංශුවය නැර යයි.

50

උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

13. ස්කන්ධය m වූ අංශුවක්, ස්වභාවික දිග l වූ සැහැල්ලු ප්‍රත්‍යාස්ථ තන්තුවක එක කෙළවරකට ඇඳා ඇති අනෙක් තන්තුවේ අනෙක් කෙළවර අචල O ලක්ෂ්‍යයකට ඇඳා ඇත. අංශුව සමතුලිතව එල්ලෙන විට තන්තුවේ විතතිය $\frac{l}{3}$ වේ. තන්තුවේ ප්‍රත්‍යාස්ථතා මාපාංකය සොයන්න.

අංශුව, O ට $\frac{l}{2}$ දුරකින් සිරස්ව පහළින් වූ ලක්ෂ්‍යයේ තබා නිශ්චලතාවේ සිට මුදා හරිනු ලැබේ. O සිට l දුරකින් සිරස්ව පහළින් වූ A ලක්ෂ්‍යය වෙත අංශුව ප්‍රථම වරට ළඟා වන විට එහි ප්‍රවේගය සොයන්න.
B යනු අංශුව ළඟා වන පහළම ලක්ෂ්‍යය යැයි ගනිමු. A සිට B දක්වා අංශුවේ චලිතය සඳහා තන්තුවේ විතතිය x යන්න $\ddot{x}+\frac{3g}{l}\left(x-\frac{l}{3}\right)=0$ සම්කරණය සපුරාලන බව පෙන්වන්න.

ඉහත සම්කරණයේ විසඳුම $x=\frac{l}{3}+\alpha\cos\omega t+\beta\sin\omega t$ ආකාරයේ බව උපකල්පනය කරමින්, α, β හා ω නියතවල අගයන් සොයන්න.
ඒ ඇසුරින්, අංශුව A සිට B දක්වා යෙදෙන සරල අනුවර්ති චලිතයේ ඔස්තාද්‍රය හා විස්තාරය සොයන්න.
මුල් තල මොහොතායේ සිට $\sqrt{\frac{l}{g}}\left\{1+\frac{2\pi}{3\sqrt{3}}\right\}$ කාලයකට පසුව අංශුව B වෙත ළඟා වන බව පෙන්වන්න.
අංශුව B හි ඇතිවිට තන්තුවේ ආතතිය සොයන්න.

ප්‍රත්‍යාස්ථ මාපාංකය λ යැයි ගනිමු.

$$T_0=\frac{\lambda\left(\frac{l}{3}\right)}{l}$$ (5)

$T_0=mg$

$$\frac{\lambda l}{3l}=mg$$

$\lambda=3mg$ (5)

$v^2=u^2+2fs$

$v^2=2g\left(\frac{l}{2}\right)$ (5)

$v=\sqrt{gl}$

උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

$T = \frac{\lambda x}{l} = \frac{3mgx}{l}$ (5)

$\underline{F} = m\underline{a}\downarrow \qquad mg - T = m\ddot{x}$ (10)

$$mg - \frac{3mgx}{l} = m\ddot{x}$$

$$\ddot{x} + \frac{3g\left(x - \frac{l}{3}\right)}{l} = 0\,; \quad x \geq 0$$ (5)

20

$x = \frac{l}{3} + \alpha\cos\omega t + \beta\sin\omega t$

$x = 0$ when $t = 0$; (5)

$0 = \frac{l}{3} + \alpha$ gives us $\alpha = \frac{-l}{3}$ (5)

$\dot{x} = -\alpha\omega\sin\omega t + \beta\omega\cos\omega t$ (5)

$\dot{x} = \sqrt{gl}$ when $t = 0$;

$\sqrt{gl} = \beta\omega$ (5)

$\ddot{x} = -\alpha\omega^2\cos\omega t - \beta\omega^2\sin\omega t$ (5)

$\frac{-3g\left(x - \frac{l}{3}\right)}{l} = -\alpha\omega^2\cos\omega t - \beta\omega^2\sin\omega t$ (5)

$\frac{-3g}{l}(\alpha\cos\omega t + \beta\sin\omega t) = -\omega^2(\alpha\cos\omega t + \beta\sin\omega t)$ (5)

$\therefore \omega^2 = \frac{3g}{l}$

එබැවින් $\omega = \sqrt{\frac{3g}{l}}$ (5) and $\beta = \sqrt{gl}\sqrt{\frac{l}{3g}} = \frac{l}{\sqrt{3}}$ (5)

45

උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

දැන් $x = \frac{l}{3} + \alpha\cos\omega t + \beta\sin\omega t$ gives us

$x - \frac{l}{3} = \alpha\cos\omega t + \beta\sin\omega t$ (5)

සරල අනුවර්ති චලිතයේ කේන්ද්‍රය $x - \frac{l}{3} = 0$ මගින් දෙනු ලබයි. (5)

$\therefore x = \frac{l}{3}$

එබැවින් කේන්ද්‍රය C යන්න, A සිට $\frac{l}{3}$ පහළින් පිහිටයි.

විස්ථාරය $= BC$

$t = t_1$ විට $\dot{x} = 0$ බැවින් $-\alpha\omega\sin\omega t_1 + \beta\omega\cos\omega t_1 = 0.$ (5)

(5)

$\Rightarrow \frac{l}{3}\sin\omega t_1 = -\frac{l}{\sqrt{3}}\cos\omega t_1$

$\tan\omega t_1 = -\sqrt{3}$

$\omega t_1 = \frac{2\pi}{3}$ (5)

$t = t_1$ විට x සෙවීම:

$x = \frac{l}{3} - \frac{l}{3}\cos\omega t_1 + \frac{l}{\sqrt{3}}\sin\omega t_1$ (5)

$= \frac{l}{3} - \frac{l}{3}\cos\frac{2\pi}{3} + \frac{l}{\sqrt{3}}\sin\frac{2\pi}{3}$

$= \frac{l}{3} + \frac{l}{6} + \frac{l}{2}$

$= l$ (5)

$\therefore BC = l - \frac{l}{3} = \frac{2l}{3}$ (5)

උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

ප්‍රථම වරට A වෙත ලඟා වීමට ගත් කාලය t_2 යැයි ගනිමු.

$s = ut + \frac{1}{2}gt^2$ ↓ යෙදීමෙන්

$u = 0, a = g, s = \frac{l}{2}, t = t_2$

$\frac{l}{2} = \frac{1}{2}gt_2^2$ (5)

$t = \sqrt{\frac{l}{g}}$ (5)

B වෙත ලඟා වීමට මුලු කාලය $= \sqrt{\frac{l}{g}} + \frac{2\pi}{3\omega}$ (5)

$= \sqrt{\frac{l}{g}} + \frac{2\pi}{3}\sqrt{\frac{l}{3g}}$

$= \sqrt{\frac{l}{g}}\left(1 + \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}\right)$ (5)

20

අංශුව B හි ඇති විට ආතතිය $= \frac{3mg}{l}(AB)$ (5)

$= \frac{3mg}{l}(l)$

$= 3mg$ (5)

10

Alevel ලාපි උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

14. (a) $OABC$ යනු එතුරශ්‍රයක් යැයි ද, D හා E යනු පිළිවෙළින් OB හා AC විකර්ණවල මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය යැයි ද ගනිමු. තවද, DE හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය F යැයි ගනිමු. O අනුබද්ධයෙන් A, B හා C ලක්ෂ්‍යවල පිහිටුම් දෙදිශ පිළිවෙළින් $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ හා $\mathbf{c}$ යැයි ගනිමින්, $\overrightarrow{OF} = \frac{1}{4}(\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c})$ බව පෙන්වන්න.

P හා Q යනු පිළිවෙළින් OA හා BC පැතිවල මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය යැයි ගනිමු. P, F හා Q ලක්ෂ්‍ය ඒකරේඛීය බව පෙන්වා $PF : FQ$ අනුපාතය සොයන්න.

(b) $ABCD$ යනු, පැත්තක දිග $2l$ හා $BD = 2l$ වූ රොම්බසයක් යැයි ගනිමු. රොම්බසයේ විකර්ණ O ලක්ෂ්‍යයෙහි දී හමු වේ. විශාලත්ව පිළිවෙළින් $2P$, $6P$, $4P$, $3P$ හා $6P$ වූ බල පිළිවෙළින් AB, BC, DC, DA හා BD දිගේ, අක්ෂර අනුපිළිවෙළින් දැක්වෙන දිශාවලට ක්‍රියා කරයි. $\overrightarrow{OC}$ හා $\overrightarrow{OD}$ දිශාවලට බල පද්ධතිය විභේදනය කර, සම්ප්‍රයුක්තයේ ක්‍රියා රේඛාව BC ට සමාන්තර වන බව පෙන්වන්න.

පද්ධතියේ O වටා සූර්ණයන් සොයන්න.

සම්ප්‍රයුක්තයේ ක්‍රියා රේඛාවට E ලක්ෂ්‍යයේ දී දික් කරන ලද AB හමු වේ නම්, $BE = 2l$ බව පෙන්වන්න.

දැන්, විශාලත්ව αP, βP, γP හා αP වූ සමාන්තර පහත අභිරේඛ බල පිළිවෙළින් EB, CE, CA හා DC දිගේ, අක්ෂර අනුපිළිවෙළින් දක්වෙන දිශාවලට ක්‍රියා කරයි. මුළු පද්ධතිය සමතුලිතතාවයේ ඇත්නම් α, β හා γ හි අගයන් සොයන්න.

(a)



උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

$\overrightarrow{OD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OB} = \left(\frac{\underline{b}}{2}\right)$ (5)

$\overrightarrow{OE} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AE}$ (5)

$= \underline{a} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC})$

$= \underline{a} + \frac{1}{2}(\underline{c} - \underline{a})$

$= \frac{\underline{a}+\underline{c}}{2}$ (5)

$\overrightarrow{OF} = \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{DF}$ (5)

$= \frac{\underline{b}}{2} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DE}$

$= \frac{\underline{b}}{2} + \frac{1}{2}(\underline{e} - \underline{d})$

$= \frac{\underline{b}}{2} + \frac{1}{2}\left(\frac{\underline{a}+\underline{c}}{2} - \frac{\underline{b}}{2}\right)$

$= \frac{\underline{a}+\underline{b}+\underline{c}}{4}$ (5)

25

$\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$ (5)

$= \underline{b} + \frac{1}{2}(\underline{c} - \underline{b})$

$= \frac{1}{2}(\underline{b} + \underline{c})$ (5)

$\overrightarrow{PF} = \overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OF}$

$= -\frac{\underline{a}}{2} + \frac{\underline{a}+\underline{b}+\underline{c}}{4}$

$= \frac{-\underline{a}+\underline{b}+\underline{c}}{4}$ (5)

www.alevelapi.com

Aeve Lapi උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

$\overrightarrow{FQ} = \overrightarrow{FO} + \overrightarrow{OQ}$

$= -\frac{\underline{a}+\underline{b}+\underline{c}}{4} + \frac{1}{2}(\underline{b}+\underline{c})$

$= \frac{-\underline{a}+\underline{b}+\underline{c}}{4}$ (5)

$\overrightarrow{PF} = \overrightarrow{FQ}$ (5)

$\Rightarrow P, F$ හා Q ඒකරේඛීය වේ. (5)

තවද $PF:FQ = 1:1$. (5)

35

(b)



(5)

$\overrightarrow{OC}$:

$X = 2P\cos 30° + 6P\cos 30° + 4P\cos 30° - 8P\cos 30°$ (5)

$= 2P.\frac{\sqrt{3}}{2}(1-3+2+4)$

$= 2\sqrt{3}P$ (5)

උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාල සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

$\overrightarrow{OD}$:

$Y = 6P - 2P\cos 60° + 6P\cos 60° - 4P\cos 60° - 8P\cos 60°$ (5)

$= 6P - 2P.\frac{1}{2}(1 - 3 + 2 + 4)$

$= 6P - 4P$

$= 2P$ (5)



$\tan\theta = \frac{Y}{X} = \frac{2P}{2\sqrt{3}P} = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$\Rightarrow \theta = 30°$ (5)

∴ සම්ප්‍රයුක්තය BC ට සමාන්තර වේ. (5)

35

O සූර්ණ ගැනීමෙන්

$M_O = 2P.l\cos 30^\circ + 6P.l\cos 30^\circ - 4Pl\cos 30^\circ + 8Pl\cos 30^\circ$ (5)

$= 2Pl\frac{\sqrt{3}}{2}(1 + 3 - 2 + 4)$

$= 6\sqrt{3}Pl$ (5) Nm

10

$R^2 = X^2 + Y^2 = (2\sqrt{3}P)^2 + (2P)^2$

$= 12P^2 + 4P^2$

$= 16P^2$ (5)

$R = 4P$

Alevel Lapi උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

O සූර්ණ ගැනීමෙන්

$6\sqrt{3}Pl = 4P(l\cos 30^\circ + x\cos 30^\circ)$, where $x = BE$ (5)

$6\sqrt{3}Pl = 4P\frac{\sqrt{3}}{2}(l + x)$

$3l = l + x$

$x = 2l$ (5)

15

සමතුලිතතාව සඳහා,

$\overrightarrow{OC}$ දිශේ විභේදනයෙන්

$2\sqrt{3}P - \gamma P = 0$ (5)

$\gamma = 2\sqrt{3}$ (5)

$\overrightarrow{OD}$ දිශේ විභේදනයෙන්

$2P - \beta P = 0$ (5)

$\beta = 2$ (5)

E සූර්ණ ගැනීමෙන්

$\alpha P 2l\cos 30^\circ - \gamma P 2l = 0$ (10)

$\alpha\sqrt{3} = \gamma . 2$

$\alpha = 2\frac{2\cdot 2\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 4$ (5)

α, β, γ සඳහා (10)

30

උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

15. (a) එක එකෙහි දිග $2a$ හා බර w වූ AB, BC හා CA දඬුවලින් සමපාද ත්‍රිකෝණාකාර දැලි කුහක් ABC සමතිරස් පැළඳෙන පරිදි ඒවායේ කෙළවරවල දී ප්‍රමව ලෙස සන්ධි කර ඇත. A ශීර්ෂය අවිල ලක්ෂයකට ප්‍රමව ලෙස අසව් කර ඇත්තේ ත්‍රිකෝණයට සිරස් තලයක නිදහසේ භ්‍රමණය වීමට හැකි වන පරිදි ය. ත්‍රිකෝණයේ තලයෙහි, BC ට ලම්බව B හි දී යෙදූ P බලයකින් ත්‍රිකෝණය, AB සිරස්ව හා AB ට වමලින් C සිටින්න පරිදි, අල්ලා තබා ඇත. P හි අගය සොයන්න.

C හි දී AC මගින් BC මත යෙදෙන බලයේ තිරස් හා සිරස් සංරචකයන් සොයන්න.

(b) යාබද රූප සටහනින් දැක්වෙන දැමුව ලෙස යන්ඩි කරන ලද සැහැල්ලු දැලි හයකින් සමන්විත රාමු සැකිල්ලක් නිරූපණය වේ. එය සිරස් තිත්තියකට A හා B හි දී ප්‍රමව අසව් කර ඇති අතර, D හි දී 150 N භාරයක් දරයි. බෝ අංකනය භාවිතයෙන් ප්‍රකාශබල සටහනක් ඇඳ, ඒ ආශ්‍රයෙන්, දඬුවල ප්‍රකාශබල, අයහි හෝ නෙරපුම් වශයෙන් දක්වමින්, නිර්ණය කරන්න.



(a)



10

පද්ධතියට A වටා සූර්ණ ගැනීමෙන්

$W(a\cos 60^0 + a + (2a - a\cos 60)) = P.2a\cos 60^0$ 15

$W\left(\frac{a}{2} + a + 2a - \frac{a}{2}\right) = 2a.\frac{1}{2}P$ 10

$P = 3W$ 5

30

උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

A $Ya - Xa\sqrt{3} = W.\frac{a}{2}$ 10

B $Ya + Xa\sqrt{3} = -W.\frac{a}{2}$ 10

$\Rightarrow \quad Y = 0$. 5

$\therefore X = -\frac{W}{2\sqrt{3}}$. 5

30

---

b)



උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

30.



දණ්ඩ	තෙරපුම	ආතතිය	විශාලත්වය
AC	-	√	$100\sqrt{3}$ N
CD	√	-	$50\sqrt{3}$ N
DE	√	-	$50\sqrt{3}$ N
CE	-	√	$100\sqrt{3}$N
BC	-	√	$50\sqrt{3}$ N
BE	√	-	$150\sqrt{3}$ N

60

www.alevelapi.com

උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාල සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

16. අරය a වූ ඒකාකාර ඝන අර්ධ ගෝලයක ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය, එහි සමමිතික අක්ෂය මත, ආධාරකයේ කේන්ද්‍රයේ සිට $\frac{3a}{8}$ දුරකින් පිහිටින බව පෙන්වන්න.



එසේම ඒකාකාර ද්‍රව්‍යයකින් සෑදී ඇති අර්ධ ගෝලයක් හා ඝන කෝනයක්, දිග $2l$ සහ ස්කන්ධය m වූ ඒකාකාර දණ්ඩක දෙකෙළවරට, රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයට අර්ධ ගෝලයේ සමමිතික අක්ෂය, දණ්ඩ හා කෝනයේ කේන්ද්‍රය එකම සරල රේඛාවක් මත පිහිටන පරිදි දෘඩ ලෙස සවි කිරීමෙන්, සංයුක්ත වස්තුවක් සාදා ඇත. කෝනයේ අරය r ද, ස්කන්ධය m ද වන අතර, අර්ධ ගෝලයේ අරය $2r$ වේ. සංයුක්ත වස්තුවේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය, අර්ධ ගෝලයේ ආධාරකයේ කේන්ද්‍රයේ සිට $\frac{1}{6}(8r+3l)$ දුරකින් පිහිටන බව පෙන්වන්න.

මෙම සංයුක්ත වස්තුව සිරස්ට θ කෝණයකින් ආනත අවල තලයක් මත, අර්ධ ගෝලයේ ආධාරකය තලය ස්පර්ශ කරමින් තබා ඇත. ලිස්සා යාම වැළැක්වීමට ප්‍රමාණවත් තරම් රළුය යැයි උපකල්පනය කරමින්, $\tan\theta < \frac{12r}{8r+3l}$ නම් සංයුක්ත වස්තුව නොපෙරළෙන බව පෙන්වන්න.

$l = \frac{4r}{3}$ හා $\theta = \frac{\pi}{6}$ නම්, සංයුක්ත වස්තුව නොපෙරළෙන බව පෙන්වා සංයුක්ත වස්තුව මත ආනත තලය මගින් යොදන අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවේ විශාලත්වය සොයන්න.



සමමිතියෙන් අර්ධගෝලයේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය සමමිතික අක්ෂය මත පිහිටයි.

(5) (10)

O සිට x දුරින් වූ δx ඝනකමකින් යුත් අංශුමාත්‍රිය තැටිය සලකමු.

O සිට ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයට දූර $\bar{X}$ යැයි ගනිමු.

උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

ද්‍රව්‍යයේ ඝනත්වය ρ යැයි ගනිමු.

δx ඝනකමින් යුත් අංශු මාත්‍රීය තැටියේ ස්කන්ධය $\approx \pi(a^2 - x^2)\,\delta x\rho$.

$$\bar{X} = \frac{\int_0^a \pi(a^2-x^2)x\rho\,dx}{\int_0^a \pi(a^2-x^2)\rho\,dx} = \frac{\left[\frac{a^2x^2}{2} - \frac{x^4}{4}\right]_0^a}{\frac{2}{3}a^3}$$

$$= \frac{3}{8}a$$

40



සමමිතියෙන්, සංයුක්ත වස්තුවෙහි ස්කන්ධය කේන්ද්‍රය සමමිතික අක්ෂය මත පිහිටයි.

උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

වස්තුව	ස්කන්ධය	කේන්ද්‍රයට O සිට දුර
	$m = \frac{4}{3}\pi r^3\rho$ 05	$3r + 2l$ 05
	$\frac{2}{3}\pi(2r)^3\rho = \frac{2}{3}\pi 8r^3\rho = 4m$ 05	$\frac{3}{8}(2r) = \frac{3r}{4}$ 05
	05 m	$2r + l$ 05
	$6m$ 05	$\bar{Y}$

$6m\bar{Y} = m(3r + 2l) + 4m\left(\frac{3r}{4}\right) + m(2r + l)$ 10

$6\bar{Y} = 8r + 3l$ 5

$\bar{Y} = \frac{1}{6}(8r + 3l)$

55



$OG = \frac{1}{6}(8r + 3l)$

$OH < 2r$ නම් සංයුක්ත වස්තුව නොපෙරළෙයි. 10

i.e. $OG\tan\theta < 2r$ 5

$\tan\theta < \frac{2r\times 6}{8r+3l} = \frac{12r}{8r+3l}$ 5

20

උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

$l = \frac{4r}{3}$, $\theta = \frac{\pi}{6}$

$\tan\theta = \tan\frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ (5)

$\frac{12r}{8r+3l} = \frac{12r}{8r+3.\frac{4r}{3}} = \frac{12r}{12r} = 1$ (5)

$\tan\theta = \tan\frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}} < 1$ (5)

$\tan\theta < \frac{12r}{8r+3l}$

∴ සංයුක්ත වස්තුව නොපෙරලෙයි. (5)

20

විභේදනයෙන්,

$R - 6mg\cos 30 = 0$ (10) $\therefore R = 3\sqrt{3}\,mg$ (5)

15

www.alevelapi.com

උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

7. (a) පාසලක එන්හරා විභාගයකට පෙනී සිටි සිසුන් 100 දෙනකු පිළිබඳ සමීක්ෂණයකට අනුව, එම සිසුන්ගෙන් 48 දෙනකු විභාගය සමත් වී ඇති බව අනාවරණය විය. තවද, මෙම සිසුන් 100 දෙනා අතරෙන් 50 දෙනකු පාසලේ දී ක්‍රීඩා කටයුතු සඳහා සහභාගි වී ඇති බව ද, 30 දෙනකු පාසලේ දී සංගීත කටයුතු සඳහා සහභාගි වී ඇති බව ද, තිවිම සිසුවකු ක්‍රීඩා කටයුතු හා සංගීත කටයුතු යන දෙකට ම සහභාගි වී නොමැති බව ද අනාවරණය විය. තවද, පාසලේ දී ක්‍රීඩා කටයුතු සඳහා සහභාගි වූ සිසුන්ගෙන් 60% ක් විභාගය සමත් වී ඇති අතර පාසලේ දී ක්‍රීඩා කටයුතු හෝ සංගීත කටයුතු සඳහා සහභාගි නොවූ සිසුන්ගෙන් 30% ක් විභාගය සමත් වී ඇත.

ඉහත සිසුන් 100 දෙනාගෙන් එක් සිසුවෙකු යෙදීමකින් වෙන්කර ගනු ලැබේ. මෙම සිසුවා

(i) පාසලේ දී සංගීත කටයුතු සඳහා සහභාගි වූ අයකු බව දී ඇති විට, ඔහු විභාගය සමත් අයකු වීමේ,

(ii) විභාගය සමත් වූ අයකු බව දී ඇති විට, පාසලේ දී ඔහු ක්‍රීඩා කටයුතු සඳහා සහභාගි වූ අයකු වීමේ

සම්භාවිතාව සොයන්න.

(b) කුඩා ලෝහ බෝල 50 කින් සමන්විත කුලකයක විෂ්කම්භවල සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් පහත දැක්වෙන වගුවේ දී ඇත:

විෂ්කම්භය (cm)	කුඩා බෝල සංඛ්‍යාව
0.80 – 0.81	1
0.81 – 0.82	3
0.82 – 0.83	9
0.83 – 0.84	20
0.84 – 0.85	14
0.85 – 0.86	2
0.86 – 0.87	1

විෂ්කම්භවල ව්‍යාප්තියේ පළමු චතුර්ථකය ගණනය කරන්න.

මෙම ලෝහ බෝල 50 කින් සමන්විත කුලකයේ විෂ්කම්භවල මධ්‍යන්‍යය හා සම්මත අපගමනය 0.835 cm හා 0.01 cm බව දී ඇත. කුඩා ලෝහ බෝල 100 ක තවත් කුලකයක් සඳහා විෂ්කම්භවල මධ්‍යන්‍යය පළමු ලෝහ බෝල 50 හි කුලකයේ විෂ්කම්භවල මධ්‍යන්‍යය ම බව ද සම්මත අපගමනය 0.015 cm බව ද දී ඇත.

ලෝහ බෝල 150 හි සංයුක්ත කුලකයේ විෂ්කම්භවල මධ්‍යන්‍යය හා විචලනාව සොයන්න.

දෙවන ලෝහ බෝල 100 ක කුලකය සඳහා මිනුම් ගැනීමේ දී භාවිත කරනු ලැබූ උපකරණය දෝෂ සහිත බව ද එමගින් එක් එක් බෝලයක විෂ්කම්භය 0.015 cm ප්‍රමාණයකින් අවතක්සේරු වී ඇති බව ද පසු ව සොයා ගනු ලැබිණ. මෙම ලෝහ බෝල 100 හි විෂ්කම්භයන්හි පත්‍ය මධ්‍යන්‍යය හා සම්මත අපගමනය සොයන්න.

(a) S, M, N හා X පහත දැක්වෙන පරිදි අර්ථ දක්වා ඇත :

S: ක්‍රීඩා කටයුතු සඳහා සහභාගි වීම

M: සංගීත කටයුතු සඳහා සහභාගි වීම

N: ක්‍රීඩා හෝ සංගීත කටයුතු සඳහා සහභාගි නොවීම

X: විභාගය සමත් වීම

10

$$\frac{48}{100} = \frac{50}{100} \times 0.6 + \frac{30}{100} \times 9 + \frac{20}{100} \times 0.3$$

34

Alevel Lapis උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

10

එවිට $P(S) = \frac{50}{100}$, $P(M) = \frac{30}{100}$, $P(N) = \frac{20}{100}$, $P(X) = \frac{48}{100}$ (5)

(5) $P(X|S) = 0.60$, $P(X|N) = 0.30$ (5)

(i) මුළු සම්භාවිතා ප්‍රමේයයෙන්,

$P(X) = P(S)P(X|S) + P(M)P(X|M) + P(N)P(X|N)$ (10)

$\frac{48}{100} = \frac{50}{100} \times 0.6 + \frac{30}{100} \times P(X|M) + \frac{20}{100} \times 0.3$ (5)

$P(X|M) = \frac{48-30-6}{30} = \frac{12}{30} = \frac{2}{5}$ (10)

(ii) බේයිස් ප්‍රමේයයෙන්, $P(S|X) = \frac{P(S)P(X|S)}{P(X)} = \frac{50 \times 0.6}{48} = \frac{30}{48} = \frac{5}{8}$

(10) (5)

75

---

b) පළමු චතුර්තකය = $\frac{50}{4}$ වන නිරීක්ෂණයේ අගය = 12.5 වන නිරීක්ෂණයේ අගය (5)

∴ පළමු චතුර්තකය පිහිටන පන්ති ප්‍රාන්තරය (0.82 -0.83) (10) (5)

∴ පළමු චතුර්තකය $= 0.82 + \frac{(12.5-4)}{9} \times 0.01$ (10)

$= 0.82 + 0.009$

$= 0.829$ (5)

25

බෝල 50 හි විෂ්කම්භයන්හි මධ්‍යන්‍යය = 0.835

බෝල 100 හි විෂ්කම්භයන්හි මධ්‍යන්‍යය = 0.835 (10)

∴ බෝල 100 හි විෂ්කම්භයන්හි මධ්‍යන්‍යය = 0.835

10

Alevel Lapi උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.

බෝල 50 හි විෂ්කම්භයන්හි විචලතාව, $S_1^2 = 0.01^2 = 0.0001$

බෝල 100 හි විෂ්කම්භයන්හි විචලතාව, $S_2^2 = 0.015^2 = 0.000225$

බෝල 150 හි විෂ්කම්භයන්හි සංයුක්ත කුලකයේ විචලතාව:

$$S^2 = \frac{n_1 S_1^2 + n_2 S_2^2}{n_1 + n_2}$$ (10)

$$= \frac{50 \times 0.0001 + 100 \times 0.000225}{150}$$

$$= \frac{0.0050 + 0.0225}{150}$$ (5)

$$= 0.00018$$

15

---

y යනු බෝල 100 හි විෂ්කම්භයන්හි නිවැරදි අගය යැයි ගනිමු.

එවිට $y = x + 0.015$; මෙහි x මුල් අගයන් වේ. (5)

(5) $\bar{y} = \bar{x} + 0.015$ හා සත්‍ය සම්මත අපගමනය = මුල් සම්මත අපගමනය (5)

∴ සත්‍ය මධ්‍යන්‍යය = 0.835 + 0.015 = 0.85 හා සත්‍ය සම්මත අපගමනය = 0.015 (5)

(5)

25

---

www.alevelapi.com

උසස් පෙළ විද්‍යා/ගණිත/කලා/වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර/සටහන් හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න www.alevelapi.com වෙත.